

Fertilgold® 6 mm(-)

INSTRUCCIONES

- Se debe aplicar FERTILGOLD® 6 mm(-) en los casos en los que el análisis de tejidos y del suelo determinen que es necesario e identifiquen la proporción adecuada a utilizar.
- Se obtendrán mejores resultados cuando la aplicación se concentre en la zona radicular activa.
- Puede aplicarse en combinación con reguladores de crecimiento vegetal, pesticidas u otros fertilizantes granulados compatibles, excepto con urea.
- Aplique FERTILGOLD® 6 mm(-) al voleo, con aviones o máquinas terrestres.
- El momento de aplicación, los intervalos y las dosis pueden variar en función de las necesidades y la etapa de desarrollo específica del cultivo, los niveles nutricionales disponibles en el suelo y el estado nutricional general del cultivo.
- El terreno debe estar húmedo para lograr una bioactividad óptima. Si el suelo está seco, se debe hidratar mediante riego.
- Comuníquese con el representante local de FERTILGOLD® o con otro especialista agrícola para solicitar recomendaciones específicas para sus cultivos.

Este producto está diseñado como suplemento para un programa de fertilización completo y por sí solo no proporcionará todos los nutrientes que generalmente necesitan los cultivos agrícolas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Conservar el producto en la bolsa original. No reenvasar con alimentos o bebidas. Eliminar siempre la bolsa de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y/o federales.

© 2017–2018 *Marca comercial registrada y producida por: Bio Huma Netics, Inc.
1331 W. Houston Ave., Gilbert, AZ 85233 USA
480.961.1220
FGO-GS-643-12102018

ANÁLISIS GARANTIZADO

0-0-0

Ácido húmico (HA) total y

ácido fúlvico 60% - 70%*

*Se determinó con el método V&B (Verploegh y Brandvoid)

Derivado de: leonardita oxidada

Diseñado para aplicarse en el suelo.

Debe evitar esparcirlo durante condiciones de humedad alta, o mezclarlo con fertilizantes con altos niveles de humedad, como por ejemplo urea.

Las aplicaciones pueden realizarse cada 30 días, según sea necesario.

APLICACIÓN

| MÉTODO | DOSIS SUGERIDA POR HECTÁREA Cultivos en campo abierto Frutales o viñedos |
|---|--|
| Aplicación en bandas o al costado del surco | Hasta 75 kg/ha Hasta 150 kg/ha |
| Al voleo o incorporado al suelo | Hasta 150 kg/ha Hasta 300 kg/ha |

SEGURIDAD

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Partículas y ceniza marrón rojizo oscuro a negro sin olor. La ingestión de este producto puede provocar dolor o irritación gastrointestinal.

CONDICIONES DE VENTA

La información incluida en esta etiqueta es precisa y confiable. El comprador y el usuario reconocen y asumen toda responsabilidad derivada del uso de este producto. Seguir atentamente las indicaciones. El momento y método de aplicación, el clima, las condiciones del cultivo y otros factores exceden la responsabilidad del vendedor.

Peso neto 907 kg
Peso neto 2.000 libras (1 tonelada)
Lote n.º 12345678

Fertilgold.com

