

Fertilgold® PROMAX®

Biopesticida

Análisis garantizado

Ingrediente activo:

Aceite de tomillo	3,5 %
Ingredientes inertes*	96,5 %
Ingredientes totales	100,0 %

*Contiene agua, melazas y glicerina.

Propiedades físicas:

Forma: Líquido

Apariencia: De color marrón brumoso a opaqué, con un olor característico único.

Peso: 9,12 lb/gal; 1,09 kg/l

pH: 5-6

Precaución:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Nocivo en caso de ingesta.

La exposición a las aspersiones o al líquido de este producto puede causar grave irritación en los ojos y posible irritación en la piel y las vías respiratorias. Esta formulación puede ser tóxica en caso de ingestión. Puede provocar una reacción alérgica en las personas sensibles.

Almacenamiento y Precauciones de Manipulación

Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejada de materiales y productos incompatibles. Para proteger los ojos y la piel del contacto con este producto, los aplicadores y demás usuarios deben utilizar una camisa con mangas largas, pantalones largos, zapatos y medias, protección ocular y guantes resistentes contra los químicos, hechos de neopreno, nitrilo o caucho natural. Evitar respirar vapores, aerosoles o aspersiones. Utilizar la formulación con la ventilación adecuada. No ingerir la formulación. Mantener el envase cerrado herméticamente cuando no se utilice. Lavar cuidadosamente con agua y jabón después de manipular este producto.

Consideraciones sobre la Eliminación:

En caso de que este producto se derrame durante el transporte, y no se cumpla con los criterios de residuos peligrosos de conformidad con CFR, título 40, sección 261 en cuanto a la no exhibición de las características de los residuos peligrosos de la Subparte C, o no se incluya como residuo peligroso de conformidad con la Subparte D como consecuencia de su toxicidad. Dado que no se trata de un residuo líquido peligroso, debería ser eliminado de conformidad con todas las normas locales, estatales y federales. Consultar a autoridades estatales o locales para obtener información sobre métodos de eliminación adecuados.

Condiciones de venta:

La información incluida en este boletín es precisa y confiable. El comprador y el usuario reconocen y asumen toda responsabilidad derivada del uso de este producto. Seguir atentamente las indicaciones. El momento y el método de aplicación, el clima y otros factores exceden la responsabilidad del vendedor.



Fungicida y Nematicida de Suelos de Amplio Espectro

Fertilgold® PROMAX® es una formulación orgánica aprobada por el OMRI para la protección de cultivos. Es un fungicida y nematicida para suelo de acción protectora y curativa recomendado para el control de enfermedades transmitidas por el suelo y nematodos parásitos de las plantas. Para uso en todas las cultivos. Su modo de acción es de eliminación por contacto. No hay un uso restringido, así que puede aplicarse durante toda la temporada de cultivo. **PROMAX®** está formulado para brindar un control máximo, al mismo tiempo que se minimizan los efectos residuales. **PROMAX®** es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes; por lo tanto, se lo considera ideal para las estrategias de mezcla en tanques y programas de rotación.

Nematodos parásitos de las plantas y cultivos (lo que incluye, entre otras cosas)		Enfermedades Originadas en el Suelo y Cultivos (incluidas, entre otros)	
Barrenadores (<i>Radopholus</i> spp.)	árboles frutales (con y sin frutos): manzanas, cerezas, cítricos, duraznos, peras	Hernia de la col (<i>Plasmodiophora brassicae</i>), Pudrición negra (<i>Xanthomonas campestris</i>)	brócoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor
Lanza (<i>Hoplolaimus</i> spp.)	algodón y hierba de césped	Pudrición de la fruta por antracnosis (<i>Colletotrichum</i> sp.), Pudrición carbonosa (<i>Macrophomina</i> sp.), Pudrición de corona (<i>Fusarium</i> sp.), Quemado de semillas (<i>Fusarium</i> sp., <i>Phytophthora</i> sp., <i>Pythium</i> sp., <i>Rhizoctonia</i> sp.), Pudrición por moho (<i>Botrytis</i> sp.), Pudrición de la raíz (<i>Fusarium</i> sp., <i>Cylindrocarpum destructans</i> , <i>Pythium</i> sp., <i>Rhizoctonia</i> sp.), Pudrición del tallo (<i>Phytophthora</i> sp., <i>Sclerotium</i> sp.), Marchitez por <i>Verticillium</i> (<i>Verticillium</i> sp.)	espárragos, habas, cosechas de col, algodón, cucurbitáceas, berenjenas, lechuga, cebollas, arvejas o chícharos, papas, frutos secos (almendras, nueces), frutas pequeñas (frutillas, arándanos, frambuesas), batatas, tabaco, tomates; árboles frutales (con o sin frutos): manzanas, duraznos, cítricos, mangos, piñas, ciruelas; hierba de césped, ornamentales y flores (azalea, geranio, alegrías del hogar)
Lesionadores (<i>Pratylenchus</i> spp.)	zanahorias, cucurbitáceas (pepinos y melones), papas, maíz, árboles frutales (con y sin frutos), cítricos, duraznos y hierba de césped	Pudrición del tallo (<i>Sclerotium rolfsii</i>)	maníes, tomates, pimientos
Reniformes (<i>Rotylenchulus</i> spp.)	algodón, tomates y árboles frutales	Pudrición blanca (<i>Sclerotium cepivorum</i>)	ajo
Anillado (<i>Circonemoides</i> spp.)	cucurbitáceas, pimientos, papas, tomates, hierba de césped		
Noduladores de raíz (<i>Meloidogyne</i> spp.)	zanahorias, algodón, cucurbitáceas, cebollas, pimientos, papas, tomates, árboles frutales (con y sin frutos), cítricos, hierba de césped		
Enquistador del grano de soja (<i>Heterodera</i> spp.)	soja		
Espiral (<i>Helicotylenchus</i> spp. y <i>Rotylenchus</i> spp.)	zanahorias, maíz dulce, batatas, hierba de césped		
De picadura (<i>Belonolaimus</i> spp.)	zanahorias, algodón, cucurbitáceas, pimientos, papas, tomates, árboles frutales (con y sin frutos), cítricos, hierba de césped		
Atrofiadores (<i>Tylenchorhynchus</i> spp.)	zanahorias, cucurbitáceas, cebollas, pimientos, tomates, hierba de césped		

Instrucciones para la aplicación:

- Al utilizar **PROMAX®** como fungicida y nematicida de acción protectora o curativa, es importante que **PROMAX®** se incorpore en el suelo. Esto puede lograrse en el riego del suelo, incorporación mecánica o como aplicación en el riego por gravedad en los surcos.
- Deben usarse dosificaciones más altas como uso curativo en suelos pesados, en campos con antecedentes de problemas de enfermedades o cuando se esperan condiciones climáticas desfavorables por el rápido crecimiento de enfermedades o actividad de nematodos.
- Debido a que esta formulación funciona principalmente por contacto, cuanto más completa es la cobertura, mejor es el rendimiento del **PROMAX®**.
- Utilice una dosificación menor como uso preventivo o en infestaciones leves.
- Repita cada 5 a 7 días para mantener el nivel de control deseado.
- Comuníquese con el representante local de Fertilgold® para solicitar recomendaciones específicas para sus cultivos.
- AGITE BIEN ANTES DE USAR. Este producto se separa. Se requiere agitar el tanque constantemente para asegurar una mezcla de rociado homogénea.

MÉTODO DE APLICACIÓN

PROPORCIÓN

Por acre / por hectárea

Aplicación mediante inyección en el suelo a través de cinta de goteo o microaspersores

Hasta 1 galón por acre / hasta 10 litros por hectárea

Aplicación mediante pulverización o irrigación por inundación o por surco

Hasta 2 galones por acre / hasta 20 litros por hectárea