# 6 mm(-)

### **INSTRUCCIONES**

- Se debe aplicar FERTILGOLD®\* 6 mm(-) en los casos en los que el análisis de tejidos y del suelo determinen que es necesario e identifiquen la proporción adecuada a utilizar.
- Se obtendrán mejores resultados cuando la aplicación se concentre en la zona radicular activa.
- Puede aplicarse en combinación con reguladores de crecimiento vegetal, pesticidas u otros fertilizantes granulados compatibles, excepto con urea.
- Aplique FERTILGOLD® 6 mm(-) al voleo, con aviones o máquinas terrestres.
- El momento de aplicación, los intervalos y las dosis pueden variar en función de las necesidades y la etapa de desarrollo específica del cultivo, los niveles nutricionales disponibles en el suelo y el estado nutricional general del cultivo.
- El terreno debe estar húmedo para lograr una bioactividad óptima. Si el suelo está seco, se debe hidratar mediante riego.
- Comuníquese con el representante local de FERTILGOLD® o con otro especialista agrícola para solicitar recomendaciones específicas para sus cultivos

Este producto está diseñado como suplemento para un programa de fertilización completo y por sí solo no proporcionará todos los nutrientes que generalmente necesitan los cultivos agrícolas.

#### ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Conservar el producto en la bolsa original. No reenvasar con alimentos o bebidas. Eliminar siempre la bolsa de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y/o federales.

© 2017–2021 \*Marca comercial registrada y producida por: Bio Huma Netics, Inc. 1331 W. Houston Ave., Gilbert, AZ 85233 USA 480.961.1220 FGO-GS-643-06082021



## ANÁLISIS GARANTIZADO 0-0-0

Ácido húmico total (HA) y

Ácido fúlvico (FA) ...... 60% - 70%

Se determinó con el método Colorimetric

Otros métodos de prueba:

Ácido húmico total (HA) ......40% - 45%

Se determinó con el método HPTA or ISO 19822

Ácido húmico total (HA) ...... 35% - 40%

Se determinó con el método CDFA

Derivado de: leonardita oxidada

## **ENMIENDA DEL SUELO**

Las aplicaciones pueden realizarse cada 30 días, según sea necesario.

MÉTODO DE APLICACÓN	VOLUMEN SUGERIDA	
	Cultivos en campo abierto	Frutales o viñedos
Aplicación en bandas o al costado del surco	Hasta 75 kg/ha 75 lbs/ac	Hasta 150 kg/ha 150 lbs/ac
Al voleo o incorporado al suelo	Hasta 150 kg/ha 150 lbs/ac	Hasta 300 kg/ha 300 lbs/ac

# 6 mm(-)

### **SEGURIDAD**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Se puede encontrar información acerca de los contenidos y niveles de metales que presenta este producto en http://www.aapfco.org/metals.html

Partículas y ceniza marrón rojizo oscuro a negro sin olor. La ingestión de este producto puede provocar dolor o irritación gastrointestinal.

#### **CONDICIONES DE VENTA**

La información incluida en esta etiqueta es precisa y confiable. El comprador y el usuario reconocen y asumen toda responsabilidad derivada del uso de este producto. Seguir atentamente las indicaciones. El momento y método de aplicación, el clima, las condiciones del cultivo y otros factores exceden la responsabilidad del vendedor.



Aprobado para producción orgánica.



Peso neto 25 kg Lote n.° 12345678

Otro gran producto de:





FERTILGOLD.COM