

INSTRUCTIONS

- FERTILGOLD® PRILLED PRILLED devrait être appliqué lorsque l'analyse des tissus et du sol détermine le besoin et le taux d'application approprié pour ce produit.
- Ajoute au sol des matières naturelles contenant des acides humiques et fulviques qui peuvent améliorer la disponibilité et l'absorption des micronutriments végétaux.
- De meilleurs résultats seront obtenus lorsque l'application sera concentrée dans la zone racinaire active ou appliquée directement sur le sol, suivie d'une culture peu profonde.
- Peut être appliqué seul ou avec d'autres engrais granulaires.
- Appliquer FERTILGOLD® PRILLED par diffusion, à l'aide de machines terrestres ou aériennes.
- Le calendrier d'application, les intervalles et les taux peuvent varier selon les besoins de chaque culture, le stade de développement, les niveaux d'éléments nutritifs disponibles dans le sol et l'état nutritionnel global de la culture.
- L'humidité du sol est nécessaire pour une bioactivité maximale. Si le sol est sec, l'humidité doit être fournie par l'irrigation.
- Consultez votre représentant local FERTILGOLD® ou un autre spécialiste agricole pour obtenir des recommandations spécifiques.

Ce produit est destiné à compléter un programme de fertilisation complet et ne fournira pas, en soi, les nutriments normalement requis par les cultures agricoles.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Conserver le produit dans le sac d'origine. Ne pas transférer dans les contenants pour aliments ou boissons. Toujours éliminer le sac conformément aux réglementations locales, provinciales et/ou fédérales.

© 2024 *Marques déposées
et créées par : Bio Huma Netics, Inc.
1331 W. Houston Ave., Gilbert, AZ 85233
480.961.1220
FGO-CA-651-09052024

0-0-0
ANALYSE GARANTIE

Teneur totale en acide humique (AH) 35,0 %-40,0 %
(Analyse à l'aide de la méthode HPTA et de l'ISO 19822)

Teneur totale en acide humique (AH) 30,0 %-35,0 %
(Analyse à l'aide de la méthode d'essai CDFA)

Provenant de : Leonardite oxydée

AMENDEMENT DU SOL

Les applications peuvent être faites aussi souvent
que tous les 30 jours, au besoin.

MÉTHODE

D'APPLICATION	TAUX SUGGÉRÉ	
	Grandes cultures	Cultures arboricoles ou viticoles
En ruban ou en bandes latérales	Jusqu'à 75 lb/acre, 85 kg/hectare	Jusqu'à 150 lb/acre, 169 kg/hectare
Épandage au sol intégré	Jusqu'à 150 lb/acre, 169 kg/hectare	Jusqu'à 300 lb/acre, 338 kg/hectare

SÉCURITÉ

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Des informations concernant le contenu et les niveaux de métaux dans ce produit sont disponibles sur le site Internet suivant <http://www.aapfco.org/metals.html>

Particules sphériques granulées d'un brun rougeâtre foncé à noir n'ayant aucune odeur. L'ingestion de ce produit peut causer une irritation gastro-intestinale ou des douleurs.

CONDITIONS DE VENTE

Les renseignements contenus dans le présent Étiquette sont supposés être exacts et fiables. L'acheteur et l'utilisateur reconnaissent et assument la pleine responsabilité découlant de l'utilisation de ce produit. Suivre scrupuleusement les consignes. La période, la méthode d'application, les conditions climatiques et l'état des cultures et d'autres facteurs sont indépendants de la volonté du vendeur.



Approuvé pour
la production
biologique

Poids net de 45 lb
Poids net de 20,4 kg
Numéro de lot : 12345678